

Let op bij gebruik van acitretine, alitretinoïne of isotretinoïne (orale retinoïden). Eén van deze substanties is de werkzame stof in het medicijn dat u voorgeschreven krijgt. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn het gaat.

Deze informatie is een aanvulling op de instructies die u van uw arts heeft gekregen. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u start met de behandeling van één van de genoemde geneesmiddelen. Het is belangrijk dat u precies weet wat u moet doen.

Herinneringskaart voor de patiënt

Naam van de arts: _____

Telefoonnummer: _____

Acitretine, alitretinoïne en isotretinoïne mogen niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Dit geneesmiddel kan ernstige schade veroorzaken bij een ongeboren baby als een zwangere vrouw dit gebruikt.

Wordt u zwanger of denkt u zwanger te zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over het gebruik van dit geneesmiddel neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u zwanger kunt raken:

- **U moet voor, tijdens en tot 1 maand na het stoppen van de behandeling minimaal 1 effectieve anticonceptiemethode gebruiken (zoals een spiraaltje of een implantaat), of op de juiste manier 2 effectieve methoden van anticonceptie gebruiken die op verschillende manieren werken (zoals een oraal anticonceptiemiddel samen met een condoom). Voor acitretine moet dit tot 3 jaar na het stoppen van de behandeling**

- **U mag niet zwanger worden** tijdens het gebruik van dit middel, of tot 1 maand (3 jaar voor acitretine) na het stoppen van de behandeling.

- **U moet aanwezig zijn bij regelmatige vervolgbezoeken en regelmatige zwangerschapstesten laten uitvoeren:**

- Voordat u met de behandeling start zal er een zwangerschapstest worden uitgevoerd, die negatief moet zijn.

- Om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent tijdens de behandeling, moeten er regelmatig zwangerschapstesten worden uitgevoerd, idealiter elke maand. U moet ook een laatste zwangerschapstest laten uitvoeren 1 maand nadat u met de behandeling bent gestopt. *Voor acitretine moet dit elke 1-3 maanden zijn gedurende een periode van 3 jaar.*

Geheugensteun voor mannen en vrouwen

Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, **deel het niet met anderen en breng eventuele ongebruikte capsules terug naar de apotheek.**

Afsprakentabel

Gebruikt u deze tabel voor het vastleggen van de data van uw afspraken met uw arts:

Naam van de arts: _____

Telefoonnummer: _____

Datum van de afspraak	Gebruikte anticonceptie	Resultaat van zwangerschapstest	Handtekening van de arts
		☐ Positief ☐ Negatief Datum:	
		☐ Positief ☐ Negatief Datum:	
		☐ Positief ☐ Negatief Datum:	
		☐ Positief ☐ Negatief Datum:	
		☐ Positief ☐ Negatief Datum:	
		☐ Positief ☐ Negatief Datum:	
		☐ Positief ☐ Negatief Datum:	

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op de website van de fabrikant. De contactinformatie van de fabrikant is terug te vinden in de bijsluiter.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.

Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).