

MONOGRAPHIE
AVEC RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

Pr **CEQUA^{MC}**

Solution ophtalmique de cyclosporine

Solution à 0,09 % p/v

Anti-inflammatoire / immunomodulateur

Groupe pharmacothérapeutique : produits ophtalmologiques, autres produits ophtalmologiques,
Code ATC : S01XA18

Sun Pharma Global FZE
Bureau n° 43, Bloc Y, Zone SAIF
Boîte postale n° 122304
Sharjah, Émirats arabes unis

Date de l'approbation initiale :
15 février 2021

Distribué par :
Sun Pharma Canada Inc.
Brampton (Ontario) L6T 1C1

Numéro de contrôle de la présentation : 234677

CEQUA^{MC} est une marque de commerce de Sun Pharma Global FZE.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
1 INDICATIONS.....	4
1.1 Enfants	4
1.2 Personnes âgées	4
2 CONTRE-INDICATIONS	4
3 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION.....	4
3.1 Considérations posologiques	4
3.2 Posologie recommandée et ajustement posologique.....	4
3.3 Administration	5
3.4 Dose oubliée.....	5
4 SURDOSAGE.....	5
5 FORMES PHARMACEUTIQUES, TENEURS, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT	6
6 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS	6
6.1 Populations particulières	7
6.1.1 Femmes enceintes	7
6.1.2 Femmes qui allaitent	8
6.1.3 Enfants.....	8
6.1.4 Personnes âgées.....	8
7 EFFETS INDÉSIRABLES	8
7.1 Aperçu des effets indésirables	8
7.2 Effets indésirables observés au cours des essais cliniques	8
7.3 Effets indésirables peu fréquents observés au cours des essais cliniques (< 1 %) ..	11
7.4 Effets indésirables observés dans le cadre de la pharmacovigilance après commercialisation	11
8 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES.....	11
8.1 Aperçu.....	11
8.2 Interactions médicament-médicament	12
8.3 Interactions médicament-aliment.....	12
8.4 Interactions médicament-plante médicinale	12
8.5 Interactions médicament-examens de laboratoire.....	12
9 MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE	12
9.1 Mode d'action	12
9.2 Pharmacodynamie.....	12
9.3 Pharmacocinétique	12
10 CONSERVATION, STABILITÉ ET MISE AU REBUT.....	13
11 PARTICULARITÉS DE MANIPULATION DU PRODUIT	13

12	RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES	14
13	ESSAIS CLINIQUES	15
13.1	Méthodes et données démographiques.....	15
13.2	Résultats	16
14	TOXICOLOGIE NON CLINIQUE.....	17
	RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS	20

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

1 INDICATIONS

CEQUA (solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % p/v) est indiqué pour augmenter la production de larmes chez les patients atteints de kératoconjonctivite sèche (sécheresse oculaire) modérée ou sévère.

1.1 Enfants

Enfants (< 18 ans) : L'efficacité et l'innocuité de CEQUA n'ont pas été établies chez les enfants. Santé Canada n'a donc pas autorisé d'indication pour cette population.

1.2 Personnes âgées

Personnes âgées (> 65 ans) : Dans l'ensemble, aucune différence n'a été observée sur le plan de l'innocuité ou de l'efficacité entre les patients âgés et les patients adultes plus jeunes.

2 CONTRE-INDICATIONS

CEQUA est contre-indiqué chez :

- les patients qui présentent une hypersensibilité à ce médicament ou à l'un des composants du produit (y compris les ingrédients non médicinaux) ou du contenant. Pour obtenir une liste complète, voir la [section 5, FORMES PHARMACEUTIQUES, TENEURS, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT](#);
- les patients atteints d'infections oculaires ou périoculaires évolutives ou soupçonnées.
- les patients atteints d'affections oculaires ou périoculaires malignes ou pré-malignes.

3 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

3.1 Considérations posologiques

Pour une utilisation ophtalmique topique.

Chaque fiole de CEQUA est prévue pour un usage unique par un seul patient.

Il n'y a pas de considérations posologiques particulières préalables à l'instauration d'un traitement par CEQUA.

3.2 Posologie recommandée et ajustement posologique

Instiller une goutte de CEQUA dans chaque œil, deux fois par jour (à environ 12 heures d'intervalle).

La dose ne doit pas dépasser deux gouttes par jour (administrées à 12 heures d'intervalle) dans l'œil ou les yeux à traiter.

Il existe peu de données d'études cliniques concernant l'administration à long terme de CEQUA

(jusqu'à 12 mois). Il est prévu que l'utilisation de CEQUA se poursuivra à long terme.

Santé Canada n'a pas autorisé d'indication chez les enfants (voir les [sections 1.1](#) et [6.1.3](#), Enfants).

3.3 Administration

La solution contenue dans la fiole à usage unique doit être utilisée immédiatement après l'ouverture de la fiole et administrée dans l'œil ou les deux yeux. La portion restante doit être jetée tout de suite après l'administration.

Il faut dire aux patients de se laver les mains avant chaque utilisation et d'éviter tout contact entre la pointe de la fiole et leur œil ou toute autre surface, afin de prévenir une blessure à l'œil ou une contamination de la solution (voir la [section 6, Mises en garde et précautions](#)).

CEQUA ne devrait pas être administré pendant que le patient porte des lentilles cornéennes. Les patients chez qui la production de larmes est diminuée ne devraient généralement pas porter de lentilles cornéennes. Aviser les patients porteurs de lentilles cornéennes qu'ils devraient retirer celles-ci avant l'administration de la solution. Les lentilles peuvent être de nouveau portées 15 minutes après l'administration de CEQUA.

CEQUA peut être utilisé en concomitance avec des larmes artificielles; un intervalle de 15 minutes doit séparer l'administration des deux produits.

3.4 Dose oubliée

Si une dose de ce médicament est oubliée, le traitement devrait être poursuivi en administrant la dose suivante au moment prévu. La dose ne devrait pas être doublée. Les patients devraient être avisés de ne pas dépasser deux gouttes par jour dans l'œil ou les yeux à traiter.

4 SURDOSAGE

On ne dispose d'aucune information concernant le surdosage topique chez les patients prenant CEQUA.

L'administration oculaire topique d'une dose excessive de cyclosporine ne devrait pas être source de toxicité oculaire. En outre, étant donné la faiblesse des concentrations de cyclosporine dans l'organisme après une administration oculaire topique, la probabilité d'une intoxication générale par suite d'une surdose topique de solution ophtalmique est infime.

En cas de surdosage soupçonné, communiquer avec le centre antipoison de la région.

5 FORMES PHARMACEUTIQUES, TENEURS, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Tableau 1 Formes pharmaceutiques, teneurs, composition et conditionnement

Voie d'administration	Formes pharmaceutiques/ teneurs/composition	Ingrédients non médicinaux
Ophtalmique	Solution contenant 0,09 % p/v de cyclosporine (0,9 mg / mL)	Chlorure de sodium, eau pour injection, huile de ricin hydrogénée de polyoxyl 40, hydroxyde de sodium ou acide chlorhydrique pour ajuster le pH, octoxynol-40, phosphate de sodium dibasique anhydre, phosphate de sodium monobasique dihydraté et polyvinylpyrrolidone.

Le CEQUA est une préparation stérile, limpide et incolore destinée à un usage ophtalmique topique. Son osmolalité se situe entre 160 et 190 mOsm/kg et son pH, entre 6,5 et 7,2.

CEQUA est présenté dans une fiole stérile à usage unique ne contenant aucun agent de conservation. Chaque fiole, fait de polyéthylène basse densité, a une capacité de 0,9 mL et contient 0,25 mL d'agent de remplissage; 10 fioles (2 cartes de 5 fioles) sont emballées dans un sachet d'aluminium Polyfoil; une boîte contient 6 sachets. Tout le contenu de chaque boîte (60 fioles) doit être fourni intact.

6 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Généralités

Le CEQUA est destiné pour un usage ophtalmique topique seulement.

Il convient de résoudre les infections oculaires ou périoculaires existantes ou soupçonnées avant l'instauration d'un traitement par le CEQUA. Si une infection se produit pendant le traitement, l'administration de CEQUA doit être interrompue jusqu'à ce que l'infection ait été enrayée.

Carcinogénèse et mutagenèse

Voir la [section 14, Toxicologie non clinique](#).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les effets du CEQUA sur la capacité d'une personne à conduire un véhicule et utiliser une machine n'ont fait l'objet d'aucune étude. Cependant, la capacité du CEQUA à induire une vision brouillée temporaire ou d'autres troubles visuels ne peut être écartée. Par conséquent, il faut dire aux patients de ne pas conduire un véhicule et de ne pas utiliser de machines jusqu'à ce que leur vision soit redevenue normale après l'administration de CEQUA.

Ophtalmologique

Le CEQUA n'a pas été étudié chez des patients ayant des antécédents de *kératite herpétique*, de maladie des glandes lacrymales en phase terminale, de kératoconjonctivite sèche (KCS) causée par la destruction des cellules caliciformes conjonctivales comme dans le cas d'une carence en vitamine A, ou de tissu cicatriciel comme dans le cas d'une pemphigoïde

cicatricielle, de brûlures causées par des produits alcalins, du syndrome de Stevens-Johnson, d'un trachome ou d'une exposition au rayonnement.

Les patients atteints d'une kératite grave doivent être suivis étroitement.

Risque de blessure et de contamination oculaires

Il faut dire au patient d'éviter tout contact entre la pointe de la fiole et l'œil ou toute autre surface, afin de prévenir une blessure à l'œil ou une contamination de la solution.

Utilisation avec des lentilles cornéennes

CEQUA ne doit pas être administré pendant que le patient porte des lentilles cornéennes. Les porteurs de lentilles cornéennes doivent retirer celles-ci avant l'administration de la solution. Les lentilles peuvent être de nouveau portées 15 minutes après l'administration de la solution ophtalmique CEQUA.

Aucune étude n'a été menée chez des patients qui portent des lentilles cornéennes.

Système hépatique

Les effets du CEQUA n'ont pas été étudiés chez des patients atteints d'insuffisance hépatique. Cependant, aucun ajustement posologique en particulier n'est nécessaire pour cette population, car l'exposition générale à la cyclosporine est faible (voir la [section 9, Mode d'action et pharmacologie clinique](#)).

Système immunitaire

Les médicaments ophtalmiques qui affectent le système immunitaire, y compris la cyclosporine, peuvent affaiblir les mécanismes de défense de l'hôte contre les infections et les tumeurs locales. Par conséquent, une surveillance régulière de l'œil ou des yeux est recommandée lorsque le CEQUA est utilisé à long terme. De plus, il est possible d'éprouver une hypersensibilité au CEQUA. Il faut dire aux patients d'arrêter le traitement en cas de réaction allergique,

Système rénal

Les effets du CEQUA n'ont pas été étudiés chez des patients atteints d'insuffisance rénale. Cependant, aucun ajustement posologique en particulier n'est nécessaire pour cette population, car l'exposition générale à la cyclosporine est faible (voir la [section 9 Mode d'action et pharmacologie clinique](#)).

6.1 Populations particulières

6.1.1 Femmes enceintes

Nous ne disposons pas de données appropriées sur l'utilisation du CEQUA chez des femmes enceintes.

Cependant, des études menées chez des animaux ont montré des effets toxiques sur la reproduction après une administration générale de la cyclosporine, à des taux d'exposition considérablement plus élevés que le taux d'exposition maximum des humains pour une utilisation ophtalmique, indiquant le peu de pertinence clinique pour l'utilisation du CEQUA (voir la [section 14, Toxicologie non clinique](#)).

Le CEQUA n'est pas recommandé pendant une grossesse, sauf si les avantages l'emportent sur les risques.

6.1.2 Femmes qui allaitent

Il a été démontré que la cyclosporine est excrétée dans le lait maternel chez l'humain après une administration générale. Cependant, aucune étude n'a été menée pour déterminer si le CEQUA est excrété dans le lait maternel chez l'humain après une administration topique. Les concentrations sanguines de cyclosporine sont faibles à la suite de l'administration topique de la solution ophtalmique CEQUA (voir la [section 9, Mode d'action et pharmacologie clinique – 9.3 Pharmacocinétique](#)). L'administration orale de cyclosporine à des rates en période de lactation n'a produit aucun effet indésirable chez la progéniture à des doses cliniquement pertinentes (voir la [section 14, Toxicologie non clinique](#)). Il n'y a aucun renseignement concernant les effets du CEQUA sur les enfants allaités et la production de lait. Les bienfaits de l'allaitement sur le développement et la santé doivent être envisagés parallèlement à la nécessité clinique d'administrer CEQUA à la mère et aux effets indésirables que la cyclosporine pourrait entraîner chez le nourrisson.

Comme beaucoup de médicaments se retrouvent dans le lait maternel chez l'humain, il faudrait faire preuve de prudence lorsque le CEQUA est administré à une femme qui allaite.

6.1.3 Enfants

Enfants (< 18 ans) : L'efficacité et l'innocuité de CEQUA n'ont pas été établies chez les enfants. Santé Canada n'a donc pas autorisé d'indication pour cette population.

6.1.4 Personnes âgées

Personnes âgées (> 65 ans) : Dans l'ensemble, aucune différence n'a été observée sur le plan de l'innocuité ou de l'efficacité entre les patients âgés et les patients adultes plus jeunes.

7 EFFETS INDÉSIRABLES

7.1 Aperçu des effets indésirables

L'effet indésirable signalé le plus fréquemment à la suite de l'administration de CEQUA a été la douleur lors de l'instillation (22 %).

7.2 Effets indésirables observés au cours des essais cliniques

Étant donné que les études cliniques sont menées dans des conditions très particulières, les taux des effets indésirables qui y sont observés peuvent ne pas refléter les taux observés dans la pratique courante et ne doivent pas être comparés à ceux observés dans le cadre des études cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables qui sont tirés d'études cliniques s'avèrent utiles pour la détermination des effets indésirables liés aux médicaments et pour l'approximation des taux.

Données sur l'innocuité regroupées des études OTX-101-2014-001 et OTX 101-2016-001

L'évaluation principale de l'innocuité se fonde sur deux études multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlées par excipient de concepts similaires d'une durée de 12 semaines, menées chez des sujets atteints de kératoconjonctivite sèche. L'étude OTX 101-

2016-001 était une étude pivot de phase 3, alors que l'étude OTX-101-2014-001 était une étude de soutien de phase 2b/3.

Dans les deux essais cliniques, 524 sujets (population retenue aux fins d'analyse de l'innocuité) ont reçu au moins une dose de CEQUA (solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 p/v). La majorité des sujets traités étaient des femmes (83 %) et l'âge moyen était de 59 ans. Le groupe de sujets traités par le CEQUA présentait une incidence plus élevée des effets indésirables (38,7 % vs 27,1 %) et des effets indésirables liés au traitement (25,2 % vs 8,6 %), que le groupe traité par l'excipient. Mais dans l'ensemble, le CEQUA a été bien toléré puisque la plupart des effets indésirables étaient considérés légers et n'ont nécessité aucun traitement.

Les effets indésirables (EI) signalés le plus fréquemment chez plus de 1 % des sujets (tableau 2) ont été une douleur au site d'instillation (22 %) et une hyperhémie conjonctivale (6 %). La plupart des effets indésirables non oculaires (≥ 1 % des sujets dans chaque groupe) étaient une céphalée et une infection des voies urinaires.

Tableau 2 Effets indésirables apparus au cours du traitement signalés chez ≥ 1 % des sujets des deux groupes de traitement - Série de données regroupées des études contrôlées de phase 3 et de phase 2b/3 (population retenue aux fins d'analyse de l'innocuité)

Terme préférentiel	Données regroupées	
	CEQUA (N=524) n (%)	Excipient (N=524) n (%)
EI oculaires		
Douleur au site d'instillation	114 (21,8)	21 (4,0)
Hyperhémie conjonctivale	30 (5,7)	19 (3,6)
Irritation oculaire	6 (1,1)	6 (1,1)
Blépharite	5 (1,0)	0
Prurit oculaire	2 (0,4)	8 (1,5)
Sensation de corps étranger dans les yeux	2 (0,4)	5 (1,0)
Corps flottants intravitréens	2 (0,4)	5 (1,0)
EI non oculaires		
Céphalée	8 (1,5)	2 (0,4)
Infection des voies urinaires	6 (1,1)	4 (0,8)
Bronchite	5 (1,0)	3 (0,6)
Sinusite	4 (0,8)	5 (1,0)
Infection des voies respiratoires supérieures	4 (0,8)	5 (1,0)
Rhinopharyngite	1 (0,2)	5 (1,0)

Les effets indésirables d'intensité sévère (1,7 % vs 0,8 %) et les effets ayant entraîné une interruption (0,8% vs 0,4 %) ou un arrêt (4,2 % vs 1,7 %) du traitement par le médicament à l'étude étaient rares. Les effets indésirables graves (1,1 % dans les deux groupes de traitement) étaient rares. Un sujet placé aléatoirement dans le groupe du CEQUA de l'étude OTX-101-2016-001 est mort d'une cause inconnue, mais considérée non liée au médicament à l'étude.

Étude de prolongation portant sur l'innocuité OTX-101-2016-002

Les données de l'innocuité à long terme proviennent de l'étude de prolongation portant sur l'innocuité, OTX-101-2016-002. Tous les 258 sujets de l'étude de phase 3 (OTX-101-2016-001) qui ont ensuite participé à l'étude de prolongation menée en ouvert de 40 semaines (OTX-101-2016-002) ont reçu un traitement par le CEQUA. Parmi eux, 129 sujets avaient reçu le CEQUA (groupe 1) et 129 sujets avaient reçu l'excipient (groupe 2) pendant les 12 semaines de l'étude OTX-101-2016-001. À la fin de l'étude de prolongation, 225 sujets avaient été exposés au CEQUA pendant plus de 6 mois, y compris 138 sujets dont l'exposition totale avait été ≥ 12 mois. La durée moyenne de l'exposition totale était de 10,42 mois.

Une analyse des effets indésirables menée sur l'ensemble de la population retenue aux fins d'analyse de l'innocuité de l'étude OTX-101-2016-002 n'a révélé aucun nouveau résultat. Le profil des effets indésirables graves n'a pas été modifié. L'effet indésirable le plus fréquemment signalé est demeuré la douleur au site d'instillation. Tel que prévu, son incidence était plus élevée pour les sujets qui avaient reçu l'excipient avant de passer au CEQUA.

Mais à part la douleur au site d'instillation (22,9 %), l'hyperhémie conjonctivale (10,1 %) et la kératite ponctuée (6,2 %) étaient les effets indésirables apparus au cours du traitement les plus fréquemment signalés (tableau 3). La kératite ponctuée a été signalée dans un plus grand nombre de sujets du groupe 1, mais elle a été considérée non liée au traitement dans tous les cas, sauf un, et la différence est attribuée à une variabilité naturelle dans la présentation de la KCS. Ces événements étaient essentiellement d'intensité légère, un seul sujet (0,4 %) ayant signalé une forme sévère.

Tableau 3 Effets indésirables apparus au cours du traitement chez $\geq 1\%$ des sujets de l'étude de prolongation portant sur l'innocuité

Terme préférentiel	Groupe 1 (N=129) n (%)	Groupe 2 (N=129) n (%)	Total (N=258) n (%)
EI oculaires			
Douleur au site d'instillation	17 (13,2)	42 (32,6)	59 (22,9)
Hyperhémie conjonctivale	12 (9,3)	14 (10,9)	26 (10,1)
Kératite ponctuée	12 (9,3)	4 (3,1)	16 (6,2)
Blépharite	3 (2,3)	4 (3,1)	7 (2,7)
Décollement du vitré	5 (3,9)	2 (1,6)	7 (2,7)
Opacification de la capsule postérieure	5 (3,9)	1 (0,8)	6 (2,3)
Irritation oculaire	2 (1,6)	2 (1,6)	4 (1,6)
Hémorragie conjonctivale	2 (1,6)	2 (1,6)	4 (1,6)
Larmoiement au site	1 (0,8)	3 (2,3)	4 (1,6)

Terme préférentiel	Groupe 1 (N=129) n (%)	Groupe 2 (N=129) n (%)	Total (N=258) n (%)
EI oculaires			
d'instillation			
Réaction au site d'instillation	1 (0,8)	3 (2,3)	4 (1,6)
Augmentation de la pression intraoculaire	2 (1,6)	1 (0,8)	3 (1,2)
EI non oculaires			
Bronchite	2 (1,6)	4 (3,1)	6 (2,3)
Sinusite	0	4 (3,1)	4 (1,6)
Arthrose	3 (2,3)	1 (0,8)	4 (1,6)
Gastro-entérite virale	2 (1,6)	1 (0,8)	3 (1,2)
Infection des voies urinaires	2 (1,6)	1 (0,8)	3 (1,2)
Migraine avec aura	1 (0,8)	2 (1,6)	3 (1,2)

Sujets du groupe 1 ayant continué avec le CEQUA pendant l'étude de prolongation sur l'innocuité.
Sujets du groupe 2 ayant commencé le traitement par le CEQUA pendant l'étude de prolongation sur l'innocuité.

7.3 Effets indésirables peu fréquents observés au cours des essais cliniques (< 1 %)

Affections oculaires : œdème conjonctival, douleur oculaire, augmentation de la sécrétion lacrymale, vision trouble.

Troubles généraux et anomalies au site d'administration : larmoiement au site d'instillation, prurit au site d'instillation, réaction au site d'instillation.

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : irritation de la gorge.

7.4 Effets indésirables observés dans le cadre de la pharmacovigilance après commercialisation

Aucune donnée de pharmacovigilance n'est disponible.

8 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

8.1 Aperçu

Le CEQUA n'a fait l'objet d'aucune étude portant sur les interactions entre les médicaments.

Les médicaments qui agissent sur le cytochrome P450 peuvent modifier le métabolisme de la cyclosporine. L'administration oculaire entraîne une absorption générale de la cyclosporine qui va de faible à non décelable (voir la section 9, MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE – [9.3 Pharmacocinétique](#)). Par conséquent, aucune interaction entre la cyclosporine administrée par voie topique et les médicaments administrés par voie générale ne devrait se produire.

8.2 Interactions médicament-médicament

Les interactions de CEQUA avec d'autres médicaments n'ont pas été établies.

Bien que de nombreux médicaments soient reconnus pour interagir avec la cyclosporine administrée par voie orale, il est peu probable que des interactions médicament-médicament générales se produisent à la suite de l'administration oculaire topique de CEQUA étant donné la très faible dose de cyclosporine utilisée (88 mcg/jour) et les faibles concentrations observées dans l'organisme au cours des études sur la toxicologie oculaire et du programme d'essais cliniques réalisés.

8.3 Interactions médicament-aliment

Les interactions de CEQUA avec des aliments n'ont pas été établies.

8.4 Interactions médicament-plante médicinale

Les interactions de CEQUA avec des produits à base de plantes médicinales n'ont pas été établies.

8.5 Interactions médicament-examens de laboratoire

Les interactions de CEQUA avec des examens de laboratoire n'ont pas été établies.

9 MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

9.1 Mode d'action

La cyclosporine est un immunosuppresseur inhibiteur de la calcineurine lorsqu'elle est administrée par voie générale. Elle inhibe l'activation des facteurs de transcription nécessaires pour l'activation des lymphocytes T et la production de cytokines inflammatoires. Chez les patients présentant une suppression de la production de larmes que l'on croit causée par une inflammation oculaire associée à la kératoconjonctivite sèche, la cyclosporine administrée par voie topique agirait comme un immunomodulateur partiel. En supprimant l'immuno-inflammation de la surface oculaire, le traitement par la cyclosporine augmente la capacité des glandes lacrymales à produire des larmes, ce qui favorise le retour d'un film lacrymal plus stable et le rétablissement de la surface oculaire. Cependant, le mode d'action exact pour le traitement de la kératoconjonctivite sèche (sécheresse oculaire) est inconnu.

9.2 Pharmacodynamie

Aucune étude sur les effets pharmacodynamiques de CEQUA n'a été réalisée.

9.3 Pharmacocinétique

Après l'administration topique de CEQUA dans chaque œil chez des sujets en bonne santé à raison de deux applications par jour au cours d'une période allant jusqu'à 7 jours, puis à raison d'une seule application le 8^e jour, les concentrations sanguines de cyclosporine étaient soit indétectables soit légèrement au-dessus de la limite inférieure de quantification de 0,100 ng/mL (valeurs extrêmes : de 0,101 à 0,195 ng/mL) jusqu'à 2 heures après l'administration d'une dose unique et jusqu'à 4 heures après l'administration de doses multiples. Bien que des valeurs

numériques supérieures aient été notées après l'administration de doses multiples comparativement à une dose unique, la concentration sanguine maximale observée n'a pas dépassé 0,200 ng/mL. Cette valeur représente moins de 0,1 % de celle à laquelle une toxicité générale pourrait être observée.

La valeur moyenne $\pm$ ET de la $C_{\max}$ était de $0,173 \pm 0,020$ ng/mL et celle de l' $ASC_{(0-t)}$ était de $0,526 \pm 0,059$ h*ng/mL chez des volontaires au 8^e jour de l'étude, et seulement 4 des 16 sujets ont eu ≥ 3 concentrations consécutives de CsA dans le sang total supérieures ou égales à la limite inférieure de quantification.

Populations particulières et états pathologiques

Enfants (< 18 ans) : L'efficacité et l'innocuité de CEQUA n'ont pas été établies chez les enfants. Santé Canada n'a donc pas autorisé d'indication pour cette population.

Personnes âgées (> 65 ans) : Dans l'ensemble, aucune différence n'a été observée sur le plan de l'innocuité ou de l'efficacité entre les patients âgés et les patients adultes plus jeunes.

Femmes enceintes ou qui allaitent : Il n'existe aucune donnée sur la présence de cyclosporine dans le lait maternel humain à la suite d'une administration topique, ni sur les effets de CEQUA sur le nourrisson et la production de lait (voir la section 6.1, Populations particulières – [6.1.2 Femmes qui allaitent](#)).

Insuffisance hépatique : Compte tenu de la faible disponibilité générale de la cyclosporine, les patients atteints d'insuffisance hépatique ne devraient être exposés à aucun risque accru après l'administration de CEQUA.

Insuffisance rénale : Compte tenu de la faible disponibilité générale de la cyclosporine, les patients atteints d'insuffisance rénale ne devraient être exposés à aucun risque accru après l'administration de CEQUA.

10 CONSERVATION, STABILITÉ ET MISE AU REBUT

Le CEQUA doit être conservé à la température ambiante (entre 15 et 25 °C). Ne pas congeler. Garder hors de la vue et de la portée des enfants. Garder les fioles à usage unique dans le sachet d'aluminium d'origine. La solution ophtalmique d'une fiole à usage unique par un seul individu doit être utilisée immédiatement après avoir été ouverte pour son administration dans un œil ou les deux yeux, et le reste du contenu doit être jeté après l'administration.

11 PARTICULARITÉS DE MANIPULATION DU PRODUIT

Il faut dire aux patients d'éviter tout contact entre la pointe de la fiole et l'œil ou toute autre surface, afin de prévenir une blessure à l'œil ou une contamination de la solution (voir la [section 6, Mises en garde et précautions](#)).

S'il y a une fuite, des particules visibles, ou la fiole est endommagée, la fiole ne doit pas être utilisée et doit être jetée.

PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

12 RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Substance pharmaceutique

Dénomination commune : Cyclosporine (USP); ciclosporine et ciclosporine A (Ph. Eur.)


Nom chimique : Cyclosporine A

Cyclo[[*(E)*-(2*S*,3*R*,4*R*)-3-hydroxy-4-méthyl-2-(méthylamino)-6-octénoyl]-
L-2-aminobutyryl-*N*-méthylglycyl-*N*-méthyl-L-leucyl-L-valyl-*N*-méthyl-L-leucyl-
L-alanyl-D-alanyl-*N*-méthyl-L-leucyl-*N*-méthyl-L-leucyl-*N*-méthyl-L-valyl]

Formule moléculaire : $C_{62}H_{111}N_{11}O_{12}$

Masse moléculaire : 1202,6

Formule développée :



Propriétés physicochimiques : La cyclosporine A se présente sous la forme d'une poudre blanche ou blanchâtre inodore. Elle est insoluble dans l'eau, soluble dans la plupart des solvants organiques (méthanol, éthanol, acétone, chloroforme et éther diéthylique) à l'exception des hydrocarbures aliphatiques (*n*-hexane). Le produit anhydre est hygroscopique.

13 ESSAIS CLINIQUES

13.1 Méthodes et données démographiques

Deux essais multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlés par excipient et comparables sur le plan méthodologique (c.-à-d., OTX-101-2014-001 et OTX-101-2016-001) ont été menés afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité du CEQUA (solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 p/v) dans le traitement de la kératoconjonctivite sèche (KCS). Les deux études étaient identiques pour ce qui est de la durée (12 semaines), du schéma posologique (1 goutte dans chaque œil, deux fois par jour) et des critères d'inclusion et d'exclusion.

Les patients inscrits aux deux études avaient signalé des antécédents de KCS remontant à ≥ 6 mois. Tous les patients avaient reçu un diagnostic clinique de KCS bilatérale, fondé sur un score de coloration conjonctivale au vert de lissamine ≥ 3 et ≤ 9 sur un score total possible de 12 (les zones 2 et 4 supérieures étaient exclues de l'évaluation) dans le même œil au moment de la sélection et au début des études. Les patients avaient attribué un score global ≥ 40 sur une échelle de 100 aux symptômes de sécheresse et/ou d'irritation.

L'étude pivot de phase 3 OTX-101-2016-001 a permis de comparer la solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % p/v à un excipient chez 744 sujets. Un seul paramètre d'efficacité principal a été désigné, soit une augmentation de la production de larmes mesurée par le pourcentage des sujets obtenant une augmentation ≥ 10 mm du score au test de Schirmer au 84^e jour, par rapport au score initial, d'après les données pour les deux yeux.

L'étude de soutien de phase 2b/3 OTX-101-2014-001 a permis de comparer deux concentrations de solution ophtalmique de cyclosporine, soit à 0,05 % p/v et 0,09 % p/v, par rapport à un excipient chez 455 sujets. Les deux coparamètres d'efficacité principaux étaient la variation moyenne du score de coloration totale de la conjonctive au 84^e jour, par rapport au score initial, mesurée dans l'œil désigné et le score global des symptômes selon le questionnaire SANDE (Symptom Assessment in Dry Eye). Sur la base des résultats de l'étude OTX-101-2014-001, la solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % p/v a été sélectionnée aux fins de développement.

Au nombre des principales variables secondaires et des autres variables d'efficacité ayant servi à comparer la solution ophtalmique de cyclosporine et l'excipient dans les deux études cliniques figuraient la variation moyenne du score au test de Schirmer par rapport au score initial, la variation moyenne du score de coloration totale et temporelle de la conjonctive au vert de lissamine par rapport au score initial, la clairance de la coloration temporelle au vert de lissamine, la variation moyenne du score de coloration totale et centrale de la cornée à la fluorescéine par rapport au score initial et la clairance de la coloration centrale de la cornée.

Les données démographiques des patients atteints de kératoconjonctivite sèche ayant participé aux études pivot et de soutien contrôlées par excipient sont présentées au [tableau 4](#). Toutes les études ont été menées avec une solution de cyclosporine administrée dans les yeux deux fois par jour. Dans ces études, 1199 patients atteints de kératoconjonctivite sèche ont été inclus dans la population en intention de traiter (solution ophtalmique de cyclosporine ou excipient).

Tableau 4 Résumé des données démographiques des patients atteints de kératoconjonctivite sèche ayant participé aux essais cliniques (population en intention de traiter)

N° de l'étude	Méthodologie	Posologie, voie d'administration et durée	Nombre de sujets (n)	Âge moyen (tranche)	Sexe
OTX-101-2016-001	Essai de phase 3, multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlé par excipient	Cyclosporine à 0,09 % ou excipient, administrés deux fois par jour dans chaque œil sous forme de solution ophtalmique durant 12 semaines (84 jours)	<u>Cyclosporine</u> 0,09 % : n = 371 <u>Excipient</u> n = 373 Total : n = 744	59,0 (18 – 90)	H = 118 (15,9 %) F = 626 (84,1 %)
OTX-101-2014-001	Essai de phase 2/3, multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlé par excipient, visant à déterminer la dose	Cyclosporine à 0,05 % ou à 0,09 % ou encore excipient, administrés deux fois par jour dans chaque œil sous forme de solution ophtalmique durant 12 semaines (84 jours)	<u>Cyclosporine</u> 0,05 % : n = 151 0,09 % : n = 152 <u>Excipient</u> n = 152 Total : n = 455	60,1 (22 – 91)	H = 94 (20,7 %) F = 361 (79,3 %)

L'étude de soutien OTX-101-2014-001 n'a pas réussi à satisfaire au coparamètre d'efficacité du changement moyen dans le score global des symptômes au 84^e jour, par rapport au score initial. Par conséquent, l'analyse de la réponse au traitement au regard du paramètre d'efficacité principal de l'étude pivot OTX-101-2016-001, soit une augmentation ≥ 10 mm du score au test de Schirmer par rapport au score initial, a été effectuée a posteriori sur la base de la moyenne des données sur les yeux de l'étude OTX-101-2014-001. Ensuite, ces données ont été analysées de nouveau suivant la méthodologie statistique de l'étude OTX-101-2016-001 (analyse des données pour les deux yeux de chaque sujet à l'aide de méthodes tenant compte de la corrélation intra-individuelle) pour soutenir les résultats du paramètre d'efficacité principal de l'étude pivot de phase 3 OTX-101-2016-001.

13.2 Résultats

Dans les deux études, comparativement à l'excipient au 84^e jour, le pourcentage de yeux présentant une augmentation ≥ 10 mm du score au test de Schirmer par rapport au score initial a été plus élevé et statistiquement significatif ($p \leq 0,01$) chez les patients sous CEQUA. Cet effet a été observé chez environ 17 % des patients traités par CEQUA comparativement à environ 9 % des patients traités par l'excipient ([tableau 5](#)).

Tableau 5 Résultats des études OTX-101-2014-001 et OTX-101-2016-001 chez des patients atteints de kératoconjonctivite sèche : test de Schirmer au 84^e jour (population en intention de traiter)

Production de larmes				
	OTX-101-2014-001		OTX-101-2016-001	
	CEQUA N = 152	Excipient N = 152	CEQUA N = 371	Excipient N = 373
Nombre des yeux	304	304	742	746
Augmentation ≥ 10 mm de la production de larmes (% d'yeux)	51 (16,8 %)	26 (8,6 %)	123 (16,6 %)	69 (9,2 %)
Différence (IC à 95 %)	8,2 % (1,9 %, 14,6 %)		7,3 % (3,3 %, 11,3 %)	
Valeur <i>p</i> vs excipient	0,0113		0,0003	

14 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

Toxicité des doses multiples

Le profil de toxicité générale de la cyclosporine (CsA) est bien établi et la préparation pharmaceutique de cyclosporine ne contient pas d'excipients nouveaux.

Les études toxicologiques non cliniques effectuées à l'appui de l'innocuité oculaire de la solution ophtalmique de cyclosporine comprenaient des études sur la tolérabilité oculaire menées durant 6 jours ou moins et des études sur la toxicité et la toxicocinétique oculaires de doses multiples menées durant 28 jours, 13 semaines et 26 semaines, au cours desquelles une solution ophtalmique de cyclosporine à des concentrations de 0,1 % ou moins a été administrée jusqu'à quatre fois par jour.

L'administration oculaire d'une solution ophtalmique de CsA à des concentrations de 0,1 % ou moins et de 0,09 % ou moins, quatre fois par jour, durant tout au plus 13 semaines et durant 26 semaines respectivement, a donné brièvement lieu à une irritation minime ou légère des tissus membraneux périoculaires chez des lapins blancs de Nouvelle-Zélande. Aucun effet sur la pression intraoculaire ou les mesures électrorétinographiques n'a été observé dans le cadre d'une étude. Les tissus oculaires ou périoculaires n'ont présenté aucun changement sur le plan histologique, hormis la légère irritation passagère observée. La marge d'exposition pour les effets oculaires chez les lapins NZW ayant reçu une solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % quatre fois par jour, pendant 26 semaines (dose quotidienne totale de 83 mcg/œil/jour administrée dans un volume de 35 µl/œil/dose), était environ 1,9 fois plus élevée que la dose ophtalmique maximale recommandée chez l'humain (DOMRH; dose quotidienne totale de 44 mcg/œil/jour; soit 22 mcg/œil/dose deux fois par jour, dans un volume de dose de 24,4 µl).

À la suite de l'administration oculaire d'une solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % quatre fois par jour pendant 26 semaines chez des lapins blancs de Nouvelle-Zélande, de faibles concentrations sanguines de CsA ont été notées ($ASC_{(0-4)}$ de $5,20 \pm 1,43$ et de $8,52 \pm 2,77$ h*ng/mL et C_{max} de $2,06 \pm 0,67$ et de $3,30 \pm 0,98$ ng/mL chez les femelles et les mâles, respectivement). Les marges d'exposition générale sécuritaires basées sur l' $ASC_{(0-4)}$ des concentrations sanguines de CsA étaient 16,2 et 9,9 fois plus élevées chez les lapins mâles et femelles, respectivement, que l'exposition générale chez l'humain à la DOMRH. Aucun effet général lié à l'administration de CsA n'a été noté après l'administration oculaire d'une solution ophtalmique de cyclosporine à des animaux.

La distribution dans les tissus oculaires et l'absorption générale de la CsA ont été évaluées chez des lapins blancs de Nouvelle-Zélande ayant reçu par voie topique une solution ophtalmique de cyclosporine à 0,05 % (17,5 mcg/œil/jour) en une dose unique (35 µL) et une solution ophtalmique de cyclosporine à 0,01 %, à 0,05 % ou à 0,1 % (doses quotidiennes de 14, 70 et 140 mcg/œil/jour), administrée par voie topique quatre fois par jour pendant 7 jours. Au terme de la phase de traitement, des échantillons de sang, de larmes et de tissus oculaires ont été prélevés aux fins d'analyse des concentrations de CsA. La CsA était largement distribuée dans les tissus oculaires, mais l'exposition générale s'est avérée minime ($C_{\max}$ moyenne $\leq$ 6,2 ng/mL). Les concentrations de CsA dans les tissus oculaires et périoculaires ont augmenté de façon proportionnelle à la dose administrée. L'administration répétée d'une solution ophtalmique de cyclosporine à 0,05 % a entraîné une augmentation de l'ASC_(0-t) indiquant une accumulation de la CsA dans tous les tissus oculaires par suite de l'administration quotidienne répétée de la solution comparativement à l'administration d'une dose unique.

L'exposition générale à la CsA a aussi augmenté après l'administration d'une solution ophtalmique de cyclosporine à 0,05 % quatre fois par jour comparativement à l'administration d'une dose unique. Cependant, la $C_{\max}$ moyenne de la CsA (2,01 ng/mL) dans le sang après l'administration répétée d'une solution ophtalmique de cyclosporine à 0,05 % dans le cadre de l'étude de 7 jours sur la distribution tissulaire s'est avérée comparable aux valeurs moyennes de la $C_{\max}$ observées à la même dose au cours des études toxicologiques menées durant 28 jours, 13 semaines et 26 semaines (1,35, 1,76 et 1,51 ng/mL, respectivement). De plus, aucune accumulation générale apparente de la CsA n'a été observée au cours des périodes de dosage de 28 jours, 13 semaines et 26 semaines. Dans l'ensemble, ces données indiquent l'absence d'accumulation générale de la CsA après l'administration oculaire répétée de la CsA pendant jusqu'à 26 semaines.

Carcinogénèse

Des études de cancérogénicité générale ont été effectuées chez des souris et des rats mâles et femelles. Au cours de l'étude de 78 semaines sur l'administration par voie orale (dans l'alimentation) de doses de 1, de 4 et de 16 mg/kg/jour chez des souris, des données probantes ont permis de dégager une tendance statistiquement significative au développement de lymphomes lymphocytaires chez les femelles. En outre, l'incidence de carcinomes hépatocellulaires observée chez les mâles recevant la dose intermédiaire dépassait significativement celle observée chez les animaux témoins.

Au cours de l'étude de 24 mois sur l'administration par voie orale (dans l'alimentation) de doses de 0,5, de 2 et de 8 mg/kg/jour chez des rats, le taux d'adénomes des îlots de Langerhans observé chez les animaux recevant la dose faible dépassait significativement celui observé chez les animaux témoins. Les carcinomes hépatocellulaires et les adénomes des îlots de Langerhans n'étaient pas liés à la dose. Les faibles doses administrées chez les souris et les rats sont environ 55 fois plus élevées que la dose ophtalmique maximale recommandée chez l'humain (DOMRH) de 1,5 µg/kg/jour, normalisée en fonction de la surface corporelle.

Mutagenèse

Parmi les tests de toxicité génétique, le test d'Ames, le test de mutation génique au locus de l'hypoxanthine-guanine-phosphoribosyl-transférase (HGPRT) sur des cellules V79 de hamster chinois, le test du micronoyau chez la souris et le hamster chinois, le test d'aberrations chromosomiques dans des cellules de moelle osseuse de hamster chinois, le test de létalité dominante chez la souris et le test de réparation de l'ADN du sperme de souris traitées ont montré que la cyclosporine n'est pas mutagène ni génotoxique. Un résultat positif a été obtenu avec la cyclosporine dans un test d'échange de chromatides sœurs réalisé in vitro sur des

lymphocytes humains.

Toxicologie de la reproduction

La cyclosporine en solution buvable (USP) s'est révélée tératogène après son administration orale à des rates et à des lapines gestantes aux doses toxiques pour les mères de 30 mg/kg/jour chez les rates et de 100 mg/kg/jour chez les lapines, comme en témoignaient l'augmentation de la mortalité prénatale et postnatale, la réduction du poids des fœtus et les retards dans la formation du squelette. Ces doses (normalisées en fonction de la surface corporelle) étaient environ 3200 et 21 000 fois plus élevées respectivement que la DOMRH, soit 1,5 µg/kg/jour. Aucun effet embryofœtal indésirable n'a été observé chez les rates ou les lapines ayant reçu par voie orale durant l'organogenèse des doses de cyclosporine allant jusqu'à 17 mg/kg/jour ou 30 mg/kg/jour, respectivement (doses environ 1800 et 6400 fois plus élevées que la DOMRH, respectivement).

La cyclosporine administrée par voie orale à raison de 45 mg/kg/jour (dose environ 4800 fois plus élevée que la DOMRH) à des rates du 15^e jour de la gestation au 21^e jour suivant la mise bas s'est avérée toxique pour les mères et a entraîné une augmentation de la mortalité postnatale chez la progéniture. Aucun effet indésirable n'a été observé chez les mères ou leur progéniture après l'administration orale de doses allant jusqu'à 15 mg/kg/jour (doses environ 1620 fois plus élevées que la DOMRH).

Altération de la fertilité

L'administration de cyclosporine par voie orale à des rats durant 12 semaines (mâles) et 2 semaines (femelles) avant l'accouplement n'a donné lieu à aucun effet indésirable sur la fertilité à des doses allant jusqu'à 15 mg/kg/jour (doses environ 1620 fois plus élevées que la DOMRH, normalisées en fonction de la surface corporelle).

**VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE
DU MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

(« sè-quoi »)

Pr**CEQUA**^{MC}

Solution ophtalmique de cyclosporine

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **CEQUA** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **CEQUA** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on CEQUA?

- CEQUA est utilisé pour traiter une affection appelée la kératoconjonctivite sèche, également connue sous le nom de sécheresse oculaire.
- CEQUA augmente la production de larmes par vos yeux.

Comment CEQUA agit-il?

CEQUA contient de la cyclosporine, un médicament qui réduit l'inflammation dans l'œil.

Quels sont les ingrédients de CEQUA?

Ingrédient médicinal : cyclosporine

Ingrédients non médicinaux : chlorure de sodium, eau pour injection, huile de ricin hydrogénée de polyoxyl 40, hydroxyde de sodium ou acide chlorhydrique pour ajuster le pH, octoxynol-40, phosphate de sodium dibasique anhydre, phosphate de sodium monobasique dihydraté et polyvinylpyrrolidone.

Sous quelles formes se présente CEQUA?

Une solution contenant 0,9 mg / mL de cyclosporine (0,09 % p/v).

CEQUA ne doit pas être utilisé si :

- vous êtes allergique à la cyclosporine ou à tout autre ingrédient du CEQUA
- vous avez une infection à l'œil
- vous avez un cancer ou une affection précancéreuse dans ou autour de l'œil

Pour aider à éviter les effets secondaires et assurer une utilisation appropriée du médicament, discutez avec votre professionnel de la santé avant de prendre CEQUA. Informez-le de toutes vos maladies et de tous vos problèmes de santé, notamment si :

- vous avez une infection virale dans l'œil appelée une kératite herpétique
- vous avez une autre maladie oculaire

Autres mises en garde :

Évitez tout contact entre la pointe de la fiole et votre œil ou toute autre surface, afin de prévenir une contamination de la solution ou une blessure à l'œil.

Lentilles cornéennes :

N'appliquez pas de CEQUA dans vos yeux pendant que vous portez des lentilles cornéennes. Les patients atteints de sécheresse oculaire ne doivent habituellement pas porter de lentilles cornéennes. Si vous devez porter des lentilles cornéennes, retirez vos lentilles avant d'appliquer le CEQUA, puis attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles cornéennes.

Conduire des véhicules et à utiliser des machines :

Après avoir appliqué du CEQUA, votre vision pourrait être brouillée pendant un certain temps. Si cela se produit, attendez que votre vision redevienne normale avant de conduire ou d'utiliser des machines.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou vous allaitez, vous pensez être enceinte ou prévoyez d'avoir un bébé, demandez des conseils à votre médecin ou votre pharmacien avant de recevoir ce médicament. Si vous êtes enceinte, le CEQUA peut atteindre votre bébé dans l'utérus. Il peut également être transmis à votre bébé par le lait maternel. Si vous êtes enceinte ou vous allaitez, votre médecin décidera si vous pouvez recevoir ce médicament.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments/drogues, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Comment prendre le CEQUA?

- Le CEQUA est destiné à être utilisé uniquement dans les yeux.
- Lavez vos mains avant d'utiliser le CEQUA.
- Utilisez le CEQUA immédiatement après avoir ouvert la fiole. Chaque fiole est prévue pour un usage unique et la solution de CEQUA doit être utilisée immédiatement après l'ouverture de la fiole. Vous devez jeter la solution restante dans la fiole après avoir appliqué le CEQUA dans votre œil ou vos yeux.
- Évitez tout contact entre la pointe de la fiole et votre œil ou toute autre surface.
- Utilisez toujours le CEQUA en suivant exactement les instructions de votre professionnel de la santé. En cas de doute, veuillez vérifier auprès de votre professionnel de la santé.
- Si vous utilisez d'autres gouttes pour les yeux, attendez au moins 15 minutes après l'application des gouttes avant d'utiliser le CEQUA. Si vous appliquez le CEQUA d'abord, attendez 15 minutes avant l'application de tout autre produit dans vos yeux, y compris des larmes artificielles.
- N'utilisez pas ce médicament si la solution contient des particules visibles ou si la fiole fuit ou semble endommagée.

Dose habituelle chez l'adulte :

Appliquez une goutte de CEQUA dans chaque œil affecté deux fois par jour, à environ 12 heures d'intervalle. Ne dépassez pas deux gouttes par jour dans chaque œil affecté.

Surdose :

Si vous pensez avoir pris une trop grande quantité de CEQUA, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez d'utiliser le CEQUA, sautez cette dose et continuez avec la prochaine dose selon l'horaire habituel. Ne doublez pas la dose pour remplacer la dose que vous avez oubliée.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés au CEQUA?

Lorsque vous utilisez le CEQUA, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent comprendre :

- Douleur à l'œil
- Irritation ou rougeur dans ou autour de l'œil
- Enflure ou rougeur au bord de la paupière
- Augmentation de la pression dans l'œil
- Maux de tête
- Enflure, démangeaisons ou inconfort dans ou autour de l'œil
- Sensation d'avoir quelque chose dans l'œil
- Larmolement accru
- Vision brouillée
- Irritation de la gorge

Effets secondaires graves et mesure à prendre			
Symptôme ou effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Si l'effet est sévère uniquement	Dans tous les cas	
PEU FRÉQUENTS			
Infection des voies urinaires : sang dans l'urine, urine trouble, mictions fréquentes, douleur ou sensation de brûlure pendant les mictions, douleur dans le bassin, forte odeur d'urine.		✓	
RARE			
Réaction allergique : difficulté à respirer, difficulté à avaler, fièvre, urticaire, démangeaisons cutanées, perte de conscience, éruption cutanée, enflure de la langue, de la gorge ou du visage.			✓

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire inconfortant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Conservation :

Conservez le produit à la température ambiante (entre 15 et 25 °C). Ne le congelez pas. Gardez les fioles à usage unique dans le sachet d'aluminium d'origine. Utilisez le contenu immédiatement après avoir ouvert la fiole. Jetez la fiole et le contenu non utilisé après l'application.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur CEQUA :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Lisez la monographie intégrale, rédigée à l'intention des professionnels de la santé. Celle-ci renferme également les Renseignements destinés aux patients. Vous pouvez les obtenir sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/drug-product-database.html>), sur le site du fabricant (www.sunpharma.com/canada) ou encore en composant le 1-844-924-0656.

Le présent feuillet a été rédigé par Sun Pharma Global FZE.
Distribué par Sun Pharma Canada Inc.

Dernière révision : 15 février 2021

CEQUA^{MC} est une marque de commerce de Sun Pharma Global FZE.