

KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA

Wasedoc

Dabigatran eteksylan

- Należy mieć kartę zawsze przy sobie/opiekun powinien mieć kartę zawsze przy sobie
- Należy upewnić się, że jest to ostatnia wersja

Marzec 2022, Wersja 1

Drogi Pacjencie / Opiekunie pacjenta pediatrycznego,

Lekarz Państwa/Państwa dziecka zalecił stosowanie leku Wasedoc (dabigatran eteksylan). Aby bezpiecznie stosować lek Wasedoc, proszę zapoznać się z istotnymi informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Ponieważ niniejsza karta ostrzegawcza dla pacjenta zawiera ważne informacje na temat leczenia Państwa/Państwa dziecka, zalecane jest aby posiadać ją zawsze przy sobie i informować pracowników służby zdrowia, że przyjmuje Pan/Pani lub Państwa dziecko lek Wasedoc.

Wasedoc - Informacje dla pacjenta / Opiekuna pacjenta pediatrycznego

Leczenie Państwa/Państwa dziecka

- Lek Wasedoc rozrzedza krew. Jest stosowany w leczeniu istniejących zakrzepów krwi lub zapobieganiu tworzenia się niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Podczas stosowania leku Wasedoc należy przestrzegać zaleceń lekarza swojego/swojego dziecka. Nigdy nie należy pomijać dawki ani przerywać przyjmowania leku Wasedoc bez konsultacji ze swoim lekarzem/lekarzem swojego dziecka.
- Należy poinformować swojego lekarza/lekarza swojego dziecka o wszystkich przyjmowanych lekach
- Należy poinformować swojego lekarza/lekarza swojego dziecka o przyjmowaniu leku Wasedoc przed jakąkolwiek operacją/zabiegiem inwazyjnym

- Lek Wasedoc można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając

szklanką wody. Kapsułek nie wolno kruszyć, rzuć ani opróżniać zawartości kapsułki.

Kiedy należy skonsultować się z lekarzem

- Przyjmowanie leku Wasedoc może zwiększyć ryzyko krwawienia. Należy natychmiast porozmawiać ze swoim lekarzem/ lekarzem swojego dziecka, jeśli wystąpią objawy krwawienia, takie jak: obrzęk, dyskomfort, nietypowy ból lub ból głowy, zawroty głowy, bladość, osłabienie, nietypowe siniaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, nietypowo długie krwawiące skaleczenia, nieprawidłowe krwawienie miesięczkowe lub krwawienie z pochwy, krew w moczu, która może być różowa lub brązowa, stolce czerwono/czarne, odkrztuszanie krwi, wymioty krwią lub treścią przypominającą fusy z kawy.

3

- W przypadku upadku lub urazu, zwłaszcza uderzenia w głowę, należy pilnie skontaktować się ze swoim lekarzem/lekarzem swojego dziecka.
- Nie należy przerywać przyjmowania leku Wasedoc bez konsultacji ze swoim lekarzem/ lekarzem swojego dziecka, jeśli wystąpią zgaga, nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku, wzdęcia lub ból w górnej części brzucha.

4

Wasedoc – informacje dla pracowników opieki zdrowotnej

- Wasedoc to doustny antykoagulant (bezpośredni inhibitor trombiny).
- W przypadku zabiegów chirurgicznych lub innych procedur inwazyjnych może być konieczne odstawienie leku Wasedoc.
- W przypadku wystąpienia poważnych krwawień należy natychmiast przerwać stosowanie leku Wasedoc.
- Dla dorosłych pacjentów dostępny jest specyficzny środek odwracający działanie (idarucyzumab). Skuteczność i bezpieczeństwo swoistego środka odwracającego działanie idarucyzumabu u dzieci nie zostało ustalone. Aby uzyskać szczegółowe informacje i dodatkowe porady dotyczące przeciwdziałania działaniu przeciwzakrzepowemu produktu Wasedoc, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Wasedoc i idarucyzumabu.
- Lek Wasedoc jest wydalany głównie przez nerki; należy utrzymać odpowiednią diurezę. Lek Wasedoc jest dializowalny.

5

Proszę o wypełnienie tej sekcji lub poproszenie o to
swojego lekarza/lekarza swojego dziecka.

Informacje o pacjencie

6

Imię i nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Wskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego

Dawka leku Wasedoc

7