

Fingolimod ▼
**Informacja
dla pacjentki**

Fingolimod SUN

**Karta przypominająca dla
pacjenteK dotycząca ciąży**



Data przygotowania: 23.03.2023 r.
Zatwierdzony przez: URPL

Przed rozpoczęciem leczenia **fingolimodem**

Fingolimod jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym (w tym nastoletnich dziewcząt) niestosujących skutecznej antykoncepcji.

Podczas rozpoczynania leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu lekarz prowadzący będzie informował Panią o ryzyku teratogennym (powodującym wady płodu) i niezbędnych działaniach minimalizujących to ryzyko.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy i uzyskać wynik negatywny, który powinien być zweryfikowany przez lekarza.

Lekarz poinformuje Panią o potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez 2 miesiące po jego zakończeniu. Należy porozmawiać z lekarzem o najbardziej skutecznych formach antykoncepcji dostępnych dla Pani.

Należy zapoznać się z treścią Przewodnika dla pacjentów, rodziców i opiekunów dla fingolimodu dostarczoną przez lekarza.

Podczas przyjmowania fingolimodu

Podczas leczenia pacjentki nie mogą zajść w ciążę.

Pacjentki muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania fingolimodu.

Pacjentki nie mogą zajść w ciążę podczas leczenia i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia.

Testy ciążowe należy powtarzać w odpowiednich odstępach czasu.

Lekarz prowadzący będzie regularnie informował pacjentkę o poważnym ryzyku związanym ze stosowaniem fingolimodu dla płodu.

Jeśli zajdzie Pani w ciążę lub jeśli chce Pani zajść w ciążę, należy omówić to z lekarzem, ponieważ leczenie fingolimodem musi zostać przerwane.

W przypadku ciąży lekarz udzieli Pani informacji.

Lekarz udzieli Pani porady medycznej dotyczącej szkodliwego wpływu fingolimodu na płód i przekaże ocenę potencjalnych skutków leczenia.

Po zakończeniu leczenia **Fingolimodem**

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli uważa Pani, że występujące u Pani SM nasila się (np. występuje osłabienie lub zaburzenia widzenia) lub jeśli zauważy Pani jakiegokolwiek nowe objawy po zakończeniu leczenia fingolimodem z powodu ciąży.

Konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia fingolimodem z uwagi na czas, jak jest potrzebny, by fingolimod został usunięty z organizmu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub pielęgniarce. Obejmuje to wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania.

Podejrzenie działań niepożądanych leku należy zgłaszać do firmy SUN Pharma pod numerem telefonu +48 22 642 07 75; lub mailowo pod adresem medinfoeurope@sunpharma.com.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Wszystkie cięższe należy zgłaszać do firmy SUN Pharma pisząc na adres mailowy medinfoeurope@sunpharma.com lub dzwoniąc na numer Informacji Medycznej firmy SUN Pharma +48 22 642 07 75.

Data przygotowania: 23.03.2023 r.
Zatwierdzony przez: URPL