

Pasiëntinligtingsblad

SKEDULERINGSSTATUS

S0

SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF (SALF)

Elke 10 g bevat 1 g povidoonjodium in 'n watermengbare basis.

Beskikbare jodium: 250 mg/25 g salf.

Lees hierdie hele voubiljet noukeurig deur omdat dit belangrike inligting vir u bevat.

SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF is sonder 'n dokter se voorskrif vir u beskikbaar om 'n matige siekte te behandel. U moet **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** nogtans versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te verkry.

- Hou hierdie blad. Dit mag nodig wees dat u dit weer moet lees.
- Moenie **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** vir enige ander persoon gee nie.
- Vra vir u gesondheidsorgverskaffer of apteker as u nog inligting of raad nodig het.
- U moet 'n dokter konsulteer as u simptome vererger of nie verbeter nie.

Wat in hierdie blad is

1. Wat **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** is en waarvoor dit gebruik word
2. Wat u moet weet voordat u **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** gebruik.
3. Hoe om **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** te gebruik
4. Moontlike nuwe-effekte
5. Hoe om **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** te bêre
6. Inhoud van die pak en ander inligting

1. WAARVOOR SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF GEBRUIK WORD

SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF word gebruik as 'n antiseptiese middel vir die behandeling van velinfeksies, druksere, wonde, snye, skaafplekke, brandwonde en vir

post-operatiewe wonde.

2. WAT U MOET WEET VOORDAT U SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF GEBRUIK

Moet nie SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF gebruik nie:

- as u hipersensitief vir povidoonjodium is.
- as u goiter het.
- as u swanger is of borsvoed.
- as u 'n groot area stukkende vel het (bv. erge en uitgebreide brandwonde).

Waarskuwings en voorsorgmaatreëls

Wees veral versigtig met SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF

- indien irritasie, swelling of rooiheid voorkom.
- as u dit op 'n pasgebore baba gebruik.
- as u aan enige skildklierafwykings ly, kan dit met skildklierfunksietoetse inmeng.

Kinders en adolessente

As dit vir neonate gebruik word, kan dit 'n onderaktiewe skildklierfunksie tot gevolg hê.

Ander medisyne en SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF

Sê altyd vir u gesondheidsorgverskaffer as u enige ander medisyne gebruik (waaronder alle aanvullende of tradisionele medisyne).

Die absorpsie van jodium vanuit **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** kan inmeng met skildklierfunksietoetse.

SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF moet vermy word as u litiumterapie ontvang, aangesien dit u skildklierfunksie kan verminder.

Gebruik van SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF met kos en drank:

Die gebruik van **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** met kos en drank is nie bepaal nie.

Swangerskap, borsvoeding en vrugbaarheid

As u swanger is of borsvoed, dink dat u dalk swanger kan wees of beplan om 'n baba te hê, moet u u dokter, apteker of ander gesondheidsorgverskaffer asseblief om advies raadpleeg voordat u hierdie medisyne gebruik.

SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF moet nie tydens swangerskap of deur lakterende vroue gebruik word nie

Motorbestuur en gebruik van masjinerie

Dit is nie altyd moontlik om te voorspel tot watter mate **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** met die daaglikse aktiwiteite van 'n pasiënt kan inmeng nie. Pasiënte moet sorg dat hulle, totdat hulle weet hoe **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** hulle beïnvloed, nie aan bogenoemde aktiwiteite deelneem nie.

3. HOE OM SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF TE GEBRUIK

Moenie medisyne wat vir u voorgeskryf is vir enige ander persoon gee nie.

Gebruik **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** altyd presies soos wat in hierdie blad beskryf word of soos wat u dokter, of apteker vir u gesê het. Raadpleeg u dokter of apteker as u nie seker is nie.

Moet nie **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** insluk nie.

Die aangetaste area moet skoon en droog gemaak word. Dien twee keer per dag toe op geaffekteerde areas of soos aangedui. 'n Okklusiewe verband kan gebruik word indien nodig.

As u meer SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF gebruik het as wat u moes

As u meer gebruik as wat u moet, sal behandeling daarvan afhang van die simptome wat u ervaar.

Raadpleeg u dokter of apteker in geval van oordosering. As nie een beskikbaar is nie, kry

hulp van die naaste hospitaal of vergiftigingsentrum.

As u vergeet om SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF te gebruik

Die uitwerking van die oorslaan van 'n dosis **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** is nie bepaal nie.

As u ophou om SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF te gebruik

Raadpleeg u dokter of apteker as u onseker is wanneer om op te hou om **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** te gebruik.

4. MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

Nie al die newe-effekte wat vir **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** aangemeld is, is in hierdie blad opgeneem nie. As u algemene gesondheidstoestand versleg of as u enige newe-effekte ervaar terwyl u **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** gebruik, moet u u gesondheidsorgverskaffer asseblief om advies raadpleeg.

Indien enige van die volgende voorkom, moet u ophou om **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** te gebruik en onmiddellik vir u dokter sê of na die ongevalle-afdeling van u naaste hospitaal gaan:

- Swelling van die gesig, lippe, mond, tong of keel wat probleme met sluk of asemhaling kan veroorsaak(angioedeem)
- Veluitslag of jeuk (pruritus)
- Jeukerige veluitslag (urtikaria)

Dit is baie ernstige newe-effekte. As u dit ervaar, kan dit wees dat u 'n ernstige allergiese of ander tipe reaksie op **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** gehad het. Dit mag wees dat u dringende mediese aandag of hospitalisasie nodig het.

Sê dadelik vir u dokter of gaan na die ongevalle-afdeling van u naaste hospitaal as u enige van die volgende opmerk:

- As u aan 'n skildklierafwyking ly en enige veranderinge opmerk.

Dit is almal ernstige newe-effekte. Dit mag wees dat u dringende mediese aandag nodig het.

Sê vir u dokter as u enige van die volgende opmerk:

Newe-effekte met onbekende frekwensie:

- Lokale irritasie
- Swelling
- Rooiheid

As u enige newe-effekte opmerk wat nie in hierdie blad genoem word nie, moet u u dokter of apteker asseblief in kennis stel.

Aanmeld van newe-effekte

Praat met u dokter of verpleegkundige as u newe-effekte kry. U kan newe-effekte ook by SAROG ("SAHPRA") aanmeld *via* die vorm "6.04 Adverse Drug Reaction Reporting Form" wat aanlyn by SAHPRA se publikasies gekry kan word:

<https://www.sahpra.org.za/Publications/Index/8>. Deur newe-effekte aan te meld, kan u help om meer inligting oor die veiligheid van **SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF** te gee.

5. HOE OM SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF TE BÊRE

Hou alle medisyne buite bereik van kinders.

- Bêre by of onder 25 °C. Hou dig toe.
- Moenie in die badkamer bêre om teen lig te beskerm nie.
- Moenie medisyne na die vervaldatum op die etiket gebruik nie.
- Gee alle ongebruikte medisyne terug aan u apteker.
- Ongebruikte medisyne moet nie in dreinerings- of rioolstelsels (bv. toilette) gegooi word nie.

6. INHOUD VAN DIE PAK EN ANDER INLIGTING

WAT SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF BEVAT

Die aktiewe bestanddeel is povidoonjodium.

Elke 10 g bevat 1 g povidoonjodium in 'n watermengbare basis.

Beskikbare jodium: 250 mg/25 g salf.

Suikervry

Die ander bestanddele is:

Poliëtileenglikol 400, poliëtileenglikol 4000, gesuiwerde water, natriumhidroksied.

Hoe SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF lyk en die inhoud van die pakkie

SEPTADINE® ANTISEPTIESE SALF is 'n gladde, amberkleurige salf met 'n kenmerkende jodiumreuk.

Buise met 25 g, buise met 50 g en flesse met 500 g.

Houer van registrasiesertifikaat

Ranbaxy Pharmaceuticals (Edms) Bpk

Lautreweg 14

Stromill, Uitbr. 1 1

Roodepoort

1724

Hierdie blad is laas hersien in

24 Augustus 2022

Registrasienommer

28/14.1/0651 (S.A)

(S3)BOT 0500772 (Botswana)

04/14.1/1005 (Namibië)

GS 168/017 (Zambië)