

PASIËNTINLIGTINGSTUK

SKEDULERINGSSTATUS:

S5

BUDEP XR 150 Verlengde-vrystelling Tablette

BUDEP XR 300 Verlengde-vrystelling Tablette

(Bupropion hidrochloried)

Lees die hele pamflet aandagtig deur voordat u BUDEP XR inneem.

- Bewaar hierdie pamflet. U moet dit miskien weer lees.
- Vra u dokter of apteker as u enige verdere vrae het.
- **BUDEP XR** is persoonlik aan u voorgeskryf en u moet u medisyne nie met ander mense deel nie. Dit kan hulle benadeel, selfs al is hulle simptome dieselfde as u s'n.

Wat is in hierdie pamflet

1. Wat **BUDEP XR** is en waarvoor dit gebruik word
2. Wat u moet weet voordat u **BUDEP XR** neem
3. Hoe om **BUDEP XR** te neem
4. Moontlike neue-effekte
5. Hoe om **BUDEP XR** te stoor
6. Inhoud van die verpakking en ander inligting.

1. WAT BUDEP XR IS EN WAARVOOR DIT GEBRUIK WORD

BUDEP XR bevat bupropionhidrochloried. **BUDEP XR** is aan u voorgeskryf vir die behandeling van depressie.

Die presiese werkingsmeganisme waardeur bupropionhidrochloried depressie verlig, word nie ten volle verstaan nie, maar daar word geglo dat dit in wisselwerking is met chemikalieë wat noradrenalin en dopamien in die brein genoem word.

BUDEP XR is slegs op doktersvoorskrif beskikbaar.

Dit kan 'n rukkie duur voordat u beter begin voel. Dit neem tyd voordat **BUDEP XR** sy volle effek het, soms weke of maande. As u wel beter begin voel, kan u dokter u aanraai om met die behandeling aan te hou om te verhoed dat die depressie terugkom.

2. WAT U MOET WEET VOORDAT U BUDEP XR NEEM

Moenie BUDEP XR neem nie:

- as u jonger as 18 is
- as u ooit 'n allergiese reaksie vir bupropionhidrochloried of enige van die bestanddele van **BUDEP XR** gehad het, soos in afdeling 6 gelys. Simptome van 'n allergiese reaksie kan lig of ernstig wees. Dit bevat gewoonlik 'n paar of al die volgende simptome: kortasem, swelling van die lippe / mond, asemhalingsprobleme, hooikoors, knopagtige uitslag ("korwe") of floute. Allergiese reaksies kan lank duur. Praat met u dokter oor die hantering van allergiese simptome.
- as u nou aanvalle het of ooit gehad het (bv. epilepsie)
- as u ander medisyne gebruik wat bupropionhidrochloried bevat
- as u gewoonlik 'n strawwe drinker is, maar het skielik opgehou drink, of as u van plan is om dit te doen terwyl u **BUDEP XR** inneem
- as u skielik opgehou het met die gebruik van kalmeermiddels (insluitend bensodiasepiene) of as u van plan is om dit te doen terwyl u **BUDEP XR** neem
- as u ooit eetstoornis gehad het (bv. bulimie of anorexia nervosa)
- as u die afgelope 14 dae medisyne vir depressie geneem het wat monoamienoksidaseremmers (MAO-remmers) genoem word, soos linesolied (wat gebruik word vir die behandeling van infeksies).
- as u 'n ernstige lewerprobleem het.

Waarskuwings en voorsorgmaatreëls

Praat met jou dokter of apteker voordat jy BUDEP XR neem:

- as u ouer as 65 is
- as u aan hartprobleme ly
- as u verhoogde bloeddruk het
- as u hoë druk in die oog gehad het
- as u aan 'n geestesversteuring ly, veral buierigheid (bipolêre versteuring, ook bekend as maniese depressie)
- as u nier- of lewerprobleme (sirroose) het.
- Hartgeleidingsversteurings bv. Brugada-sindroom - as jy 'n toestand genaamd Brugada-sindroom het ('n seldsame oorerflike sindroom wat die hartritme aantast) of as hartstilstand of skielike dood in jou gesin voorgekom het.

BUDEP XR het getoon dat dit aanvalle (epilepsie) veroorsaak. Dit is meer waarskynlik dat aanvalle sal voorkom:

- as u 'n ernstige kopbesering of 'n geskiedenis van koptrauma gehad het
- as u aan 'n breingewas ly
- as u 'n geskiedenis van aanvalle het
- as u ander medisyne gebruik (antidepressante, antipsigotika, malariamiddels, kinoloonantibiotika, kalmerende antihistamiene, teofillien, tramadol of kortikosteroïede) wat die risiko van aanvalle kan verhoog
- as u gereeld baie alkohol drink
- as u baie medisyne (kalmeermiddels) gebruik om angs te behandel
- as u suikersiekte het waarvoor u insulien of tablette gebruik

- as u eetlusdempers gebruik.
- as u 'n aanval (aanval) tydens die behandeling het, stop dan met die gebruik van **BUDEP XR** en neem nie meer nie. Gaan na u dokter.

Gedagtes oor selfmoord of verergering van u toestand:

As u depressief is, kan u soms dink dat u uself skade berokken of doodmaak. Hierdie gedagtes kan vererger wanneer u die eerste keer antidepressante begin gebruik. Dit neem tyd om te werk - gewoonlik ongeveer twee weke vanaf die begin, maar soms langer.

U kan meer geneig wees om jouself te benadeel of te vermoor as:

- u al voorheen gedagtes gehad het om uself dood te maak of te benadeel
- u jonger as 25 is
- u depressief is of voel om selfmoord te pleeg of u gedrag onlangs verander het.

Sommige mense raak depressief, prikkelbaar en soms kan hulle daaraan dink om selfmoord te pleeg, of probeer om dit te doen. Hierdie simptome het mense wat bupropion inneem, beïnvloed, meestal in die eerste paar weke van behandeling.

As u depressief voel of aan selfmoord dink, kontak u dokter of gaan dadelik na 'n hospitaal.

As een van die bogenoemde op u van toepassing is, sal u dokter daaraan aandag skenk of 'n ander behandeling aanbeveel.

Kinders en tieners

Die behandeling met **BUDEP XR** word nie aanbeveel vir kinders en tieners onder die ouderdom van 18 jaar nie, omdat dit waarskynlik nie veilig is nie.

Ander medisyne en BUDEP XR:

Vertel altyd vir u gesondheidswerker as u ander medisyne gebruik (dit sluit aanvullende of tradisionele medisyne in).

Ken die medisyne wat u neem. Hou 'n lys daarvan om u gesondheidsorgverskaffer en apteker te wys elke keer as u 'n nuwe medisyne kry.

Vertel die dokter as u die volgende gebruik:

- siklofosfamied, ifosfamied (vir die behandeling van kanker)
- prasugrel (gebruik om bloedklontvorming te voorkom)
- simetidien (word gebruik om sekere soorte maagsweer te behandel en te voorkom)
- tiklopidien of klopidogrel (word gebruik om hartsiektes of beroerte te behandel)
- levodopa, amantadien of orfenadrien (vir die behandeling van Parkinson se siekte)
- nortriptilien, desipramie, imipramie, paroksetien, fluoksetien, norfluoksetien, fluvoksamien, sertralie, sitalopram, klomipramien (medisyne om depressie te behandel)
- beta-blokkers (soos metoprolol), wat hoofsaaklik gebruik word om hoë bloeddruk te behandel
- propafanoon, flekainied (om onreëlmatige hartritme te behandel)
- haloperidol, risperidon, tioridasien, closapien, olansapien (vir die behandeling van geestesgesondheidsprobleme)
- karbamasepien, fenobarbitoon, fenitoïn, lamotrigien of valproaat (vir die behandeling van epilepsie)
- ritonavir, lopinavir / ritonavir, nelfinavir, efavirenz (vir die behandeling van MIV-infeksie).

As u **BUDEP XR** en nikotienvervangingsterapie (dws nikotienplakkers of nikotiengom) saam gebruik, kan u bloeddruk verhoog. U dokter sal waarskynlik u bloeddruk gereeld wil nagaan om seker te maak dat dit binne aanvaarbare vlakke bly.

BUDEP XR met alkohol:

Sommige mense vind dat hulle meer sensitief is vir alkohol as hulle **BUDEP XR** neem. U dokter kan voorstel dat u nie alkohol drink terwyl u **BUDEP XR** gebruik nie, of probeer om so min as

moontlik te drink. As u alkoholinnam nou hoog is, moet u nie net skielik stop nie, u kan die risiko loop om 'n aanval te kry.

Swangerskap en borsvoeding

Moenie **BUDEP XR** neem as u swanger is nie, dink dat u swanger is, van plan is om swanger te word of u baba tans borsvoed.

As u swanger is of u baba borsvoed, raadpleeg u dokter, apteker of ander gesondheidswerker vir advies voordat u **BUDEP XR** neem.

Bestuur en gebruik van masjinerie

BUDEP XR kan u vermoë om te bestuur en masjiene te gebruik beïnvloed. Sorg dat u weet hoe u op **BUDEP XR** reageer voordat u bestuur, masjiene gebruik of enige ander aktiwiteit doen wat gevaarlik kan wees as u nie waaksaam is nie.

BUDEP XR bevat laktose

BUDEP XR-tablette bevat laktosemonohidraat. As u dokter u meegedeel het dat u sommige suikers (laktose of melksuiker) nie verdra nie, moet u met u dokter praat voordat u **BUDEP XR**-tablette inneem.

BUDEP XR bevat laktose wat 'n effek kan hê op die beheer van u bloedsuiker as u diabetes mellitus het.

3. HOE OM BUDEP XR TE NEEM

Moenie medisyne wat vir u voorgeskryf is met enige ander persoon deel nie.

Neem **BUDEP XR** altyd presies soos u dokter u opdrag gegee het. Raadpleeg u dokter of apteker as u nie seker is nie.

Neem **BUDEP XR**-tablette minstens 24 uur uitmekaar.

BUDEP XR kan vroegoggend met of sonder kos geneem word.

Moenie **BUDEP XR** naby slaapyd neem nie, dit kan probleme veroorsaak om te slaap.

Sluk **BUDEP XR**-tablette heel in. Moet dit nie kou, fyndruk of sny as u dit doen nie, die medisyne sal te vinnig in u liggaam vrygestel word. Dan sal u meer geneig wees om newe-effekte te hê, insluitend aanvalle.

Dosis vir depressie

Die gewone dosis is 150 mg een keer per dag, wat verhoog kan word tot 300 mg een keer per dag, indien die medisyne goed verdra word.

As u behandeling van 'n ander bupropion medisyne na **BUDEP XR** verander, sal u dokter op die toepaslike dosis besluit.

U dokter sal u toestand gereeld monitor en dan die dosis en duur van die behandeling bepaal.

Moenie ophou om **BUDEP XR** te neem sonder om eers met u dokter te praat nie. U moet u dosis geleidelik verminder.

As u die indruk het dat die effek van **BUDEP XR** te swak of te sterk is, moet u met u dokter of apteker praat.

As u meer BUDEP XR geneem het as wat u moes

Die simptome van 'n oordosis sluit in dat u slaperig raak, dat u bewusteloosheid en EKG verander. In geval van oordosering, kontak u dokter of apteker onmiddellik.

Indien nie een beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifinligtingsentrum. Neem hierdie pamflet en die oorblywende tablette saam, sodat die dokter weet wat u geneem het. U kan newe-effekte hê, en u dokter kan u behandeling onderbreek.

As u vergeet het om BUDEP XR te neem

Moenie bekommerd wees as u vergeet het om 'n dosis te neem nie. Kontak u dokter so spoedig moontlik.

Neem dit sodra u op dieselfde dag onthou. As u die tablet nie dieselfde dag inneem nie, neem dan die volgende dag u normale dosis. Moenie 'n dubbele dosis neem om die vergete dosisse

As u opgehou het om BUDEP XR te neem

U moet elke dag **BUDEP XR** neem, dit help om u toestand te beheer, maar dit is nie 'n genesing daarvoor nie. Dit is belangrik om nie op te hou om **BUDEP XR** te neem net omdat u beter voel nie omdat u toestand dan kan verswak.

Vra u dokter of apteker as u verdere vrae het oor die gebruik van **BUDEP XR**.

4. MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

BUDEP XR kan newe-effekte hê. Nie alle newe-effekte wat vir **BUDEP XR** gerapporteer is nie, is in hierdie pamflet ingesluit nie. Raadpleeg u dokter, apteker of ander gesondheidswerker vir advies indien u algemene gesondheid erger word of as u enige ongewenste effekte ervaar.

As u een van die volgende newe-effekte ervaar, staak die inname van **BUDEP XR** en vertel dit onmiddellik aan u dokter of gaan na die ongevalle-afdeling van u naaste hospitaal:

Minder gereelde newe-effekte:

- skielike tekens van allergie soos uitslag, jeuk of korwe op die vel, swelling in die gesig, lippe, tong of ander liggaamsdele, kortasem, hygende asemhaling of probleme met asemhaling, lae bloeddruk, koors, pyn (anafilaktiese reaksie vertraagde hipersensitiwiteit)
- 'n wydverspreide uitslag met blase en afskilferende vel, veral rondom die mond, neus, oë en geslugsdele (Stevens-Johnson-sindroom)

- rooi, dikwels jeukende kolle, soortgelyk aan die uitslag van masels, wat op die ledemate en soms op die gesig en die res van die liggaam begin. Die kolle kan blase vorm of vorder tot verhoogde, rooi, liggeel merke. Diegene wat geraak word, kan koors, keelseer, hoofpyn en / of diarree hê (erythema multiforme)
- ernstige vorming van vlokke of afskilfering van die vel (eksfoliatiewe dermatitis)
- aanvalle: Sommige pasiënte wat die maksimum dosis **BUDEP XR** inneem, loop die risiko van 'n aanval. Die kans dat dit sal gebeur, is groter as u 'n te hoë dosis inneem, as u sekere medisyne in kombinasie met **BUDEP XR** inneem, of as u 'n groter kans het as gewoonlik vir aanvalle as die bevolking in die algemeen. As u bekommerd is, praat met u dokter. As u 'n aanval gehad het, vertel dit aan u dokter wanneer u herstel het. Neem nie meer tablette nie.

Dit is alles baie ernstige nuwe-effekte. As dit voorgekom het, het u moontlik 'n ernstige reaksie op **BUDEP XR** gehad. U benodig moontlik dringende mediese hulp of hospitalisasie.

Vertel dit dadelik aan u dokter of gaan na die ongevalle-afdeling in u naaste hospitaal as u een van die volgende opmerk. In sommige gevalle sal u dokter u dosis **BUDEP XR** moet verminder of die behandeling moet onderbreek:

Minder gereelde nuwe-effekte:

- vergeling van die vel of oë, buikpyn, onverklaarbare moegheid, donkerkleurige urine of ligkleurige ontlasting; dit kan manifestasies wees van 'n lewerprobleem (geelsug, hepatitis), lewerskade
- aanvalle, beroerte
- erge buikpyn met naarheid of braking. Dit kan manifestasies van pankreatitis wees
- ernstige veranderinge in geestestoestand, insluitend aggressie, woede en gewelddadige gedrag (psigose of manie).

Frekwensie onbekend:

- gedagtes oor selfmoord en selfskending (selfmoordgedagtes), selfmoordgedrag of neiging, werklike selfmoord. Selfmoord is aangemeld met die gebruik van bupropion.

Dit is alles ernstige newe-effekte. U benodig moontlik dringende mediese hulp.

Vertel u dokter as u een van die volgende opmerk:

Gereelde newe-effekte:

- hoofpyn of migraine, duiseligheid, slaperigheid, senuweeagtigheid
- jeuk, sweet, veluitslag, korwe
- bewerigheid, bewing
- angstig of opgewonde voel, nie in staat is om te slaap nie
- droë mond, maagpyn of ander ontsteltenis (braking, hardlywigheid), eetlus, gewigstoename of gewigsverlies (meer as 2,5 kg)
- veranderinge in bloeddruk, bloos
- ringgeluid in die ore, gehoorprobleme, gesigstoornisse, smaakverlies
- keelpyn en ongemak tydens sluk (keelontsteking)
- gevoel van spanning of volheid in die neus, wange en agter u oë (sinusitis), hoes
- swakheid, moegheid, koors, borspyn
- menstruele klagtes
- rusteloosheid of probleme om stil te sit (akathisia)
- verminderde seksuele dryfkrag.

Minder gereelde newe-effekte:

- veranderinge in bloedsuikervlakke
- verward voel, depressief voel

- voel onrustig, geïrriteerd, vyandig, aggressief of paranoïes, voel onwerklik of vreemd (depersonalisering), voel of dinge glo wat nie daar is nie (hallusinasies / dwalings), vreemde drome, tinteling of gevoelloosheid (parestesie), geheueverlies
- sukkel om te konsentreer
- ongekontroleerde bewegings, rukkings, spierstyfheid, probleme met loop of koördinasie
- floute (sinkopee)
- verhoogde hartklop (vinnig, stadig of onreëlmatig)
- hartkloppings, warm gloede, verhoogde of verlaagde bloeddruk
- duiseligheid tydens opstaan, veral as u uit 'n sit- of lêposisie opstaan (posturale hipotensie)
- verwyding van bloedvate (vasodilatasie)
- verhoogde lewerensieme
- ernstige allergiese reaksies; uitslag tesame met gewrigs- en spierpyn
- urinering min of meer as gewoonlik, dringende behoefte om te urineer, probleme of pyn as u urineer. Dit kan simptome van urienweginfeksie wees
- abnormale vaginale bloeding (vaginale bloeding).

Frekwensie onbekend:

- kneusplekke (ekkimose)
- moegheid, hoofpyn, kortasem tydens oefening, duiseligheid en bleek lyk. Dit is alles simptome van 'n toestand wat bekend staan as bloedarmoede of pankitopenie
- toename of afname in witbloedselle (leukositose, leukopenie)
- geswelde kliere in die nek, oksel of lies (limfadenopatie)
- bloeding of kneusplekke makliker as normaal (trombositopenie)
- bloeding of bloedstollingskomplikasies
- suiker (glukose) in die urine (glikosurie)

- abnormale koördinasie
- ontkoppel of los van die liggaam en gedagtes (depersonalisering)
- emosionele labiliteit
- buitengewoon ooraktief (hiperkinesie)
- ongewone spierstyfheid wat swak beheer van beweging veroorsaak (hipertonie)
- oormatige fisiese sensitiwiteit, veral van die vel (hiperestesie)
- spin sensasie (vertigo)
- geheueverlies (geheueverlies)
- 'n gevoel dat 'n mens se omgewing nie werklik is nie, veral as 'n simptoom van geestelike versteuring (derealisering)
- abnormale rekord van die elektriese aktiwiteit van die brein
- gebrek aan normale beweging (akinesie)
- onvermoë om taal te verstaan of te formuleer (afasie)
- koma
- probleme met praat (dysartrie)
- onbeheerbare ruk-, ruk- of kriewelbewegings (dyskinesie, ontmaskerende tardiewe dyskinesie)
- gevoel van uiterste geluk (euforie)
- onbeheerbare bewegings (ekstrapiramidale sindroom)
- ongewone verminderde of stadige liggaamsbeweging (hipokinesie)
- verhoogde seksuele dryfkrag
- erge steek- of kloppende pyn langs een of meer senuwees (neuralgie)
- gevoelloosheid of swakheid van die arms en bene (neuropatie)
- droë oog
- verhoogde druk in die oog (gloukoom met hoeksluiting)

- verwydde pupille (mydriasis)
- ineenstorting, gevoelloosheid of swakheid van die arms of bene, hoofpyn, duiseligheid en verwarring, gesigversteuring, sukkel om te sluk, sluwe spraak en spraakverlies. Dit kan simptome van beroerte wees
- ongewone vinnige hartklop (ekstrasistoles)
- swelling en rooiheid langs 'n aar wat baie sag is as dit aangeraak word (flebitis)
- verstopping van longslagaar (longembolie)
- ernstige longinfeksie (longontsteking)
- maal, kners of tande kners (bruxisme)
- sooibrand
- tandvleisontsteking (tandvleisontsteking)
- geswelde, rooi, seer tong (glossitis)
- verhoogde speekselafskeiding
- mondsere (stomatitis)
- dors
- diarree, gewoonlik met bloed en slym, maagpyn, koors (kolitis)
- ontsteking van die voedselpyp (slukderm)
- bloeding in die spysverteringskanaal, van die mond tot die rektum
- gebreekte derm (dermperforasie)
- hoë suiker (glukose) vlakke in die bloed. Die simptome kan insluit die uitskeiding van groot hoeveelhede urine, oormatige dors en 'n droë mond en vel (hiperglukemie)
- lae suiker (glukose) vlakke in die bloed (hipoglisemie)
- oormatige harigheid, veral by vroue (hirsutisme)
- beenkrampe
- tydelike verlamming of swakheid van spiere (rabdomiolise)

- onvermoë om 'n ereksie te kry of te onderhou (impotensie)
- meer urinering as normaalweg (poliurie)
- abnormale ejakulasie
- ontsteking van die blaas (sistitis)
- pynlike geslagsgemeenskap (dyspareunia)
- pyn tydens urinering (disurie)
- borsvergroting by mans (ginekomastie)
- menopouse
- pynlike ereksie
- ontsteking van die fallopiese buise (salpingitis)
- onbeheerbare, onwillekeurige urinering (urinêre inkontinensie))
- ontslag en jeuk in die vagina as gevolg van infeksie (vaginitis)
- verhoogde sensitiwiteit van die vel vir son (fotosensitiwiteit).

Gedagtes van selfmoord of verergering van u toestand

As u depressief is, kan u soms dink om uself te benadeel of te vermoor. Hierdie gedagtes kan toeneem as u eers met antidepressante begin. Hierdie medisyne neem tyd om te werk - gewoonlik ongeveer twee weke, maar soms langer (sien **Wees veral versigtig met BUDEP XR**).

Kinders jonger as 18 jaar:

BUDEP XR moet nie gebruik word vir die behandeling van kinders jonger as 18 jaar nie. Daar is 'n verhoogde risiko vir selfmoordgedagtes en gedragsprobleme wanneer kinders jonger as 18 jaar met antidepressante behandel word.

As u enige newe-effekte opmerk wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, moet u u dokter of apteker daarvan in kennis stel.

Rapportering van newe-effekte

Indien jy newe-effekte kry, bespreek dit met jou dokter, apteker of verpleegster.

Jy kan ook newe-effekte aanmeld aan SAHPRA via die Med Safety APP (Medsafety X SAHPRA) en die e-verslagverskaffing platform (who-umc.org) wat op SAHPRA se webwerf gevind kan word. Deur newe-effekte aan te meld, kan u help om meer inligting aangaande die veiligheid van **BUDEP XR** te verskaf.

As nadelige reaksies vermoed word kan die ook aan die Houer van sertifikaat van registrasie per e-pos of telefonies gerapporteer word: pharmacovigilance.africasme@sunpharma.com of tel: +27(0) 12 643 2000.

5. HOE OM BUDEP XR TE BERG

Stoor alle medisyne buite bereik van kinders.

- Bewaar by of benede 25 ° C.
- Bewaar in die oorspronklike verpakking totdat dit benodig word.
- Stuur alle ongebruikte medisyne aan u apteker.
- Moenie ongebruikte medisyne weggooi in riool of rioolstelsels nie.

6. INHOUD VAN DIE VERPAKKING EN ANDER INLIGTING

Wat BUDEP XR bevat

Die aktiewe bestanddeel is bupropionhidrochloried.

BUDEP XR 150: Elke tablet met verlengde vrystelling bevat 150 mg bupropionhidrochloried.

Bevat suiker: laktosemonohidraat 4,76 mg per tablet.

BUDEP XR 300: Elke tablet met verlengde vrystelling bevat 300 mg bupropionhydrochloried.

Bevat suiker: laktosemonohidraat 9,73 mg per tablet.

Die ander bestanddele is: etiel sellulose (ethocel 45 cps standard premium), gliserielbeheenaat (Compritol ATO 888), hidroksiepropielsellulose (HPC-L), hipromellose (Methocel E5 premium), isopropielalkohol, metakrilsuur kopolimeer dispersie (Eudragit L30D-55) , metileenchloried, Opacode S-1-17823 (swart), poliëtileenglikool 6000, povidoon (plasdoon K90 D), gesuiwerde water, silikondioksied (Syloid 244 FP),steariensuur en trietielsitraat.

Hoe BUDEP XR lyk en die inhoud van die verpakking

BUDEP XR 150: Wit tot room, ronde, filmomhulde tablette bedruk met “**L2**” in swart ink aan die een kant en glad aan die ander kant.

BUDEP XR 300: Wit tot liggeel, ronde, filmomhulde tablette bedruk met “**L**” in swart ink aan die een kant en glad aan die ander kant.

BUDEP XR 150 en **BUDEP XR 300** tablette word verpak in HDPE-bottels. Elke HDPE bottel bevat 30 tablette.

HDPE Bottelverpakking:

Wit ondeursigtige HDPE-bottel met wit ondeursigtige skroefsluiting met induksie-seëlvoering en 'n HDPE 1 g-droogmiddelhouer wat geaktiveerde silikagel (60%) en geaktiveerde koolstof (40%) bevat.

Houer vand die registrasiesertifikaat

RANBAXY PHARMACEUTICALS (EDMS) BPK

Lautreweg 14, Stormill, Uitb.1,

Roodepoort, 1724

Ranbaxy Pharmaceuticals (Pty) Ltd

Bupropion XR 150 & 300 mg

Extended release tablets

Suid-Afrika

Tel: +27(0) 12 643 2000

Die pamflet was hersien in

Oktober 2024

Registrasiennommers

BUDEP XR 150: 48/1.2/0114

BUDEP XR 300: 48/1.2/0115